

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Chetamol 400 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere  
Paracetamolo

## 2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

Ogni ml di prodotto contiene:

### Principio attivo:

Paracetamolo ..... 400 mg

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione per uso in acqua da bere.  
Soluzione viscosa, limpida, di colore rosa.

## 4. CONFEZIONI

1 L

5 L

## 5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Suini.

## 6. INDICAZIONI

Trattamento sintomatico della febbre in caso di malattie respiratorie in combinazione con un'appropriata terapia antinfettiva, se necessaria.

## 7. MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE.

Utilizzare in acqua da bere.

30 mg di paracetamolo per kg di peso corporeo al giorno, per 5 giorni, per via orale nell'acqua da bere, equivalente a 0,75 ml di soluzione orale per 10 kg di peso corporeo al giorno per 5 giorni.

La quantità in ml di medicinale veterinario da aggiungere per litro d'acqua deve essere calcolata come segue:

$$\frac{0,075 \text{ ml prodotto/kg p.c./giorno}}{\text{p.c. medio di singoli animali (kg)}} \times \text{numero di animali da trattare}$$

Consumo totale di acqua (litri) di questi animali il giorno precedente

Il consumo di acqua medicata dipende dalle condizioni cliniche degli animali. Per ottenere un dosaggio corretto, la concentrazione nell'acqua di bevanda deve essere calcolata di conseguenza.

**Per evitare un sottodosaggio e garantire un dosaggio corretto, il peso corporeo dovrebbe essere determinato nel modo più accurato possibile.**

### Consigli per una corretta somministrazione

#### Raccomandazioni per la diluizione:

La solubilità massima del prodotto in acqua (dolce/dura) a (5°C/20°C) è di 30 mL/L.

Prima aggiungere nel contenitore la quantità di acqua necessaria per la preparazione della soluzione finale. Quindi aggiungere il prodotto mentre si mescola la soluzione. Per le soluzioni madre e

quando si utilizza un dosatore, fare attenzione a non superare la solubilità massima che può essere raggiunta nelle condizioni date. Regolare l'impostazione della portata della pompa dosatrice in base alla concentrazione della soluzione madre e all'assunzione di acqua degli animali da trattare.

La soluzione deve essere preparata fresca ogni 24 ore. Nessuna altra fonte di acqua da bere deve essere disponibile durante il periodo di trattamento.

Posologia:

## 8. TEMPI DI ATTESA

Carne e frattaglie: zero giorni.

## 9. AVVERTENZE SPECIALI

### *Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione*

L'effetto anti-piretico del prodotto è atteso 12-24 ore dopo l'inizio del trattamento.

Animali con ridotta assunzione di acqua e/o in condizioni di malessere generale devono essere trattati per via parenterale.

In caso di malattia ad eziologia mista, virale e batterica, dovrà essere attuata contemporaneamente una appropriata terapia antinfettiva.

### *Precauzioni speciali per l'impiego negli animali*

Nessuna.

### *Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali*

Questo medicinale veterinario può essere dannoso in caso di ingestione accidentale. Non fumare, mangiare o bere durante la manipolazione del medicinale veterinario. In caso di ingestione accidentale, consultare un medico.

Questo medicinale veterinario può essere dannoso in caso di contatto accidentale con la pelle o gli occhi non protetti. Indossare indumenti, guanti, occhiali e mascherina adeguati durante la manipolazione del prodotto.

In caso di contatto con la pelle o con gli occhi sciacquare immediatamente con abbondante acqua.

Se i sintomi persistono, consultare un medico. Lavarsi le mani dopo l'uso del medicinale veterinario. Questo medicinale veterinario può causare ipersensibilità (allergia). Le persone con nota ipersensibilità al paracetamolo o ad uno qualsiasi degli eccipienti devono evitare il contatto con il medicinale veterinario.

### **Controindicazioni**

Non usare in caso di ipersensibilità al paracetamolo o a uno qualsiasi degli eccipienti.

Non usare in animali con grave insufficienza epatica.

Non usare in animali con grave insufficienza renale. Vedere anche la sezione "Interazione con altri prodotti medicinali e altre forme di interazione".

Non usare in animali disidratati o ipovolemici.

### **Reazioni avverse**

In rari casi, a dosaggi terapeutici possono comparire temporaneamente feci molli che possono persistere fino a 8 giorni dalla sospensione del trattamento. Ciò non ha alcun effetto sulle condizioni generali degli animali e si risolve senza alcun trattamento specifico.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati manifesta reazioni avverse)
- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)

- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati)
- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati)
- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se viene rilevato qualche effetto collaterale, anche non riportato in questa etichetta, o se si ritiene che il farmaco non abbia funzionato, informare il proprio veterinario.

In alternativa è possibile segnalare tramite il proprio sistema nazionale di notifica (<https://www.salute.gov.it/portale/moduliServizi/dettaglioSchedaModuliServizi.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=FMV&idSrv=PSK&flag=P>)

### **Gravidanza e allattamento:**

Studi sui ratti non hanno rilevato alcun effetto teratogeno o fetotossico alle dosi terapeutiche. La somministrazione del prodotto alle scrofe fino a tre volte la dose raccomandata durante la gravidanza o l'allattamento non ha evidenziato reazioni avverse. Pertanto il prodotto può essere somministrato durante la gravidanza e l'allattamento.

### **Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione.**

Deve essere evitata la somministrazione contemporanea di sostanze nefrotossiche.

### **Incompatibilità**

È stato dimostrato che il prodotto è fisicamente e chimicamente compatibile con le sostanze attive Amoxicillina, Sulfadiazina/Trimetoprim, Doxiciiclina, Tilosina, Tetraciclina, Colistina. In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

### **Sovradosaggio**

Dopo la somministrazione di paracetamolo a dosi cinque volte superiori a quelle raccomandate, possono occasionalmente comparire feci liquide con particelle solide. Ciò non ha alcun effetto sulle condizioni generali degli animali.

In caso di sovradosaggio accidentale può essere usata acetilcisteina.

### **10. DATA DI SCADENZA**

SCAD: MM/AAAA.

Periodo di validità dopo prima apertura: 6 mes1.

Periodo di validità dopo dissoluzione in acqua conformemente alle istruzioni: 24 ore.

### **11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Questo medicinale veterinario non richiede particolari condizioni di conservazione.

Non utilizzare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Dopo la prima apertura, tenere la bottiglia o la tanica ben chiusi

### **12. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

I medicinali non devono essere smaltiti attraverso le acque di scarico o i rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario come smaltire i medicinali non più necessari. Queste misure dovrebbero aiutare a proteggere l'ambiente.

### **13. SOLO PER USO VETERINARIO**

**14. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.**

**15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio e fabbricante responsabile del rilascio del lotto: Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì.

**16. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Bottiglia in polietilene ad alta densità (HDPE) con tappo a vite in HDPE con un sigillo di garanzia termosaldato plastica/alluminio (PEHD/PP/PE/AL) – A.I.C. n. 105614034

**17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto N°:            del

DA VENDERSI SOLTANTO DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO VETERINARIA IN COPIA UNICA NON RIPETIBILE.

SPAZIO PER CODICE A  
LETTURA OTTICA



chemifarma® s.p.a.  
INDUSTRIA FARMACEUTICA VETERINARIA