

## **COLISID**

120 mg/ml

**soluzione per uso in acqua da bere o in alimento liquido destinata a: vitelli da latte, suini, polli da carne, tacchini, galline ovaiole, conigli.**

### **INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE**

Ogni ml di soluzione contiene:

*Principi attivi:*

Colistina solfato mg 120

*Eccipienti:* q. b. a ml 1,00.

### **FORMA FARMACEUTICA**

Soluzione per uso orale.

### **CONFEZIONI**

Confezione da 1 L.

Confezione da 5 L.

Confezione da 10 L.

### **SPECIE DI DESTINAZIONE**

Vitelli da latte, suini, polli da carne, tacchini, galline ovaiole, conigli.

### **INDICAZIONI**

Enterite batterica da germi Gram negativi quali *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Haemophilus*, *Pasteurella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Shigella spp.*, *Pseudomonas*, *Enterobacter spp.* e *Proteus spp.*

### **POSOLOGIA E VIA DI SOMMINISTRAZIONE.**

Diluire accuratamente nell'acqua da bere o nel mangime liquido al seguente dosaggio: da 4,2 a 5,0 ml di prodotto per 100 kg di peso vivo (pari a 5,0 - 6,0 mg di principio attivo/kg p.v.) in funzione dell'età, del peso e del consumo di acqua degli animali, per 3-15 giorni. Al fine di assicurare un dosaggio corretto, determinare il più accuratamente possibile il peso corporeo per evitare un sottodosaggio. Utilizzare apparecchiature per il dosaggio idoneamente e adeguatamente calibrate.

Non miscelare in mangimi solidi.

Per una corretta somministrazione togliere l'alimento liquido residuo e somministrare quello medicato con "COLISID", nella quantità stabilita dal medico veterinario. Si consiglia di eseguire il trattamento ogni 12 ore, suddividendo la dose giornaliera in due somministrazioni. Al termine della terapia si ripristini nuovamente l'alimento non medicato.

### **TEMPI DI ATTESA**

*Carne e visceri:*

Suini: 0 giorni

Conigli: 0 giorni

Vitelli: 7 giorni

Polli da carne: 0 giorni

Tacchini: 1 giorno

*Uova:*

Galline ovaiole: 0 giorni

### **AVVERTENZE SPECIALI**

#### **Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione**

L'assunzione dell'acqua medicata da parte degli animali può essere alterata a seguito della malattia. L'utilizzo ripetuto e protratto va evitato migliorando le prassi di gestione mediante pulizia e disinfezione.

#### **Precauzioni speciali per l'impiego negli animali**

L'uso del medicinale veterinario (colistina) nel pollame deve essere conforme al regolamento CE 1177/2006 della Commissione e alle normative nazionali di recepimento.

A causa di possibili variazioni nel tempo e geografiche della sensibilità delle specie microbiche target alla Colistina, si raccomanda di effettuare l'esame batteriologico e test di sensibilità. L'uso inappropriato del prodotto potrebbe incrementare la prevalenza ai germi resistenti alla Colistina e ridurre l'efficacia dei trattamenti con altri antibiotici del gruppo delle polimixine a causa della possibile comparsa di resistenza crociata.

Non lasciare a disposizione di altri animali l'acqua medicata.

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali**

Non sono necessarie particolari precauzioni per l'operatore se si manipola il prodotto seguendo i consueti procedimenti di preparazione o di somministrazione. Tuttavia è buona norma evitare il contatto con la pelle e con gli occhi e l'inalazione del medicinale. Gli operatori, pertanto, devono utilizzare dei guanti protettivi per manipolare il prodotto. In caso di contaminazione accidentale lavare abbondantemente con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste, consultare il medico.

Le persone con nota ipersensibilità alla colistina devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

**Controindicazioni**

Non somministrare ad animali con ipersensibilità accertata alla Colistina. Non somministrare a poligastrici con rumine funzionante.

**Reazioni avverse**

L'uso prolungato del prodotto può indurre fenomeni di dismicrobismo intestinale e favorire lo sviluppo di microrganismi non sensibili.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questa etichetta, si prega di informarne il medico veterinario.

**Impiego nel corso della gravidanza, dell'allattamento o l'ovodeposizione**

Non vengono segnalati effetti di particolare gravità nelle specie di destinazione. In ogni caso usare conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

**Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione**

Presenta resistenza crociata con la polimixina B.

**Incompatibilità**

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

**Sovradosaggio**

Non sono noti sintomi da sovradosaggio.

**DATA DI SCADENZA**

SCAD: MM/AAAA.

**PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore. L'acqua medicata deve essere conservata al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 12 ore.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 3 mesi.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta/foglietto illustrativo.

**PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

DA VENDERSI SOLTANTO DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO VETERINARIA IN TRIPLICE COPIA  
NON RIPETIBILE.

**SOLO PER USO VETERINARIO.**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto N°:

Scad:

**NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Confezione da 1 L. AIC n° 102550011.

Confezione da 5 L. AIC n° 102550047.

Confezione da 10 L. AIC n° 102550050.

**TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E RESPONSABILE DEL RILASCIO DEL LOTTO:**

Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì.

