

TESTO ETICHETTA/FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

testo della etichetta esterna.

COXIVET 10%

soluzione per uso orale per colombi da affezione.

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI

1 ml contiene:

Amprolium HCl mg 100

Eccipienti:

q. b. a ml 1,00

FORMA FARMACEUTICA:

soluzione, limpida incolore o di colore leggermente giallo, per uso orale da diluire nell'acqua da bere.

CONFEZIONE

Bottiglia da 45 ml

Bottiglia da 25 ml

Bottiglia da 100 ml

SPECIE DI DESTINAZIONE:

colombi da affezione.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

coccidiosi.

MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE:

per via orale, diluito nell'acqua di bevanda.

POSOLOGIA:

0,35 ml di prodotto/kg p.v. (pari 35,0 mg di amprolium/kg di peso vivo) corrispondenti a circa 7 gocce; somministrare per 7 giorni consecutivi.

TEMPO DI ATTESA:

non pertinente.

Gli animali trattati non devono essere destinati al consumo umano.

CONTROINDICAZIONI E REAZIONI AVVERSE:

nessuna nota. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questa etichetta, si prega di informare il veterinario.

AVVERTENZE

Il trattamento dovrebbe essere effettuato in base agli esiti dell'esame parassitologico sulle feci. L'uso prolungato può indurre la selezione di specie resistenti. Se dai risultati di tale esame è evidente lo sviluppo di resistenza all'amprolium, utilizzare anticoccidici appartenenti ad un'altra classe farmacologia e con diverso meccanismo d'azione.

Quando il contenuto nella dieta di Tiamina (vit. B1) è eccessivo, è possibile avere una ridotta attività anticoccidica; altresì, se l'amprolium è presente nell'acqua medicata in concentrazione elevata, si può manifestare nell'ospite carenza di tiamina che può ridurre l'attività anticoccidica.

L'utilizzo ripetuto e protratto va evitato, migliorando le prassi di gestione mediante pulizia e disinfezione

non usare in uccelli in ovodeposizione.

Non somministrare contemporaneamente a vitamina B.

Evitare il contatto diretto con il prodotto durante la sua manipolazione ed indossare adatti indumenti e guanti protettivi per manipolare il prodotto. In caso di contaminazione accidentale lavarsi accuratamente con acqua.

In mancanza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata dei bambini

Conservare il medicinale ad una temperatura non superiore a 25 °C, nella confezione originale, in luogo fresco.

Dopo la prima apertura del contenitore usare entro 3 mesi.

L'acqua medicata deve essere utilizzata entro 12 ore dalla preparazione.

Non usare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE VETERINARIO INUTILIZZATO E/O I MATERIALI DI RIFIUTO:

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

SOLO PER USO VETERINARIO

MEDICINALE VETERINARIO SOGGETTO A PRESCRIZIONE.

DA VENDERSI SOLTANTO DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO-VETERINARIA NON RIPETIBILE

Lotto n°: del:

SCADENZA:

Confezione: 45 ml. AIC n°: 102525072.

confezione da 25 ml AIC n°: 102525058

confezione da 100 m. AIC n°: I: 102525060

NOME ED INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE:

Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì.