

## FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:

**FLUMECHINA 2% LIQUIDA CHEMIFARMA, 20 mg/ml, soluzione orale per uso in acqua da bere o in mangime liquido per uccelli da gabbia e da voliera e colombi viaggiatori**

**1.** NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Chemifarma S.p.A.  
Via Don Eugenio Servadei, 16  
47122 Forlì

### **2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

FLUMECHINA 2% LIQUIDA CHEMIFARMA, 20 mg/ml, soluzione orale per uso in acqua da bere o in mangime liquido per uccelli da gabbia e da voliera e colombi viaggiatori  
Flumechina

### **3. INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

Ogni ml contiene:

**Principio attivo:**

Flumechina 20 mg

### **4. INDICAZIONI**

Malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali sostenute da colibacilli, salmonelle, pasteurelle sensibili alla flumechina.

### **5. CONTROINDICAZIONI**

Non usare in casi di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti.

Non utilizzare per la profilassi.

Non utilizzare in caso di resistenza ai chinoloni.

### **6. REAZIONI AVVERSE**

Nessuna segnalata.

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

### **7. SPECIE DI DESTINAZIONE**

Uccelli da gabbia e da voliera e colombi viaggiatori.

### **8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Somministrare nell'acqua da bere alle dosi 4,5 ml/l di acqua (pari a 90 gocce per litro di acqua) pari a 45 mg di principio attivo per kg di p.v. per 3-5 giorni.

Il flacone è provvisto di contagocce che rilascia gocce da 0,05 ml, pertanto 20 gocce corrispondono ad 1 ml.

## **9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Evitare la somministrazione in acque eccessivamente acide.  
Non miscelare in mangimi solidi.

## **10. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.  
Uso non autorizzato in animali che producono alimenti per consumo umano.

## **11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.  
Proteggere dalla luce e dall'umidità.  
Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta e sulla scatola dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 3 mesi.  
Periodo di validità dopo diluizione nell'acqua da bere o mangime liquido conformemente alle istruzioni: 24 ore.

## **12. AVVERTENZE SPECIALI**

### Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

L'assunzione del medicinale da parte degli animali può essere alterata a seguito della malattia.  
L'utilizzo protratto va evitato migliorando la prassi di gestione e mediante pulizia e disinfezione.

### Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Durante l'uso del medicinale veterinario è necessario attenersi ai regolamenti ufficiali e locali sull'uso di prodotti antimicrobici.  
Se possibile, i chinoloni devono essere usati esclusivamente in base ai risultati dell'antibiogramma.  
Un utilizzo di tali prodotti diverso dalle istruzioni fornite nel foglietto illustrativo può condurre ad un aumento della prevalenza dei batteri resistenti ai chinoloni e allo stesso tempo ridurre l'efficacia del trattamento con altri (fluoro) chinoloni a causa della resistenza crociata.  
Non lasciare a disposizione di altri animali l'acqua medicata.

### Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Adottando consueti procedimenti di preparazione o di somministrazione dei prodotti non sono necessarie particolari precauzioni per l'operatore, tuttavia è buona norma evitare l'ingestione, l'inalazione e il contatto diretto con la pelle e con gli occhi.  
In caso di contatto o ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.  
Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione. Lavare le mani dopo l'uso.  
Le persone con nota ipersensibilità ai chinoloni devono evitare contatti con il medicinale veterinario.  
Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza.

Ovodeposizione:

Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio-beneficio del veterinario responsabile.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:

La somministrazione di flumechina è incompatibile con quella di sulfamidici sistemici e trimethoprim per competizione nel legame con le proteine plasmatiche.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Non sono noti sintomi da sovradosaggio.

Non superare le dosi consigliate.

Incompatibilità:

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

**13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

**14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

Gennaio 2024

**15. ALTRE INFORMAZIONI**

Confezioni da 20 ml, 30 ml, 100 ml.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

