

Testo della confezione esterna

Sulfadimetossina 2,5% - Sulfachinossalina 2,5% - Diaveridina 2,5% liquido Chemifarma
Soluzione per uso orale per uccelli da gabbia e da voliera

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 g contiene

Principi attivi:

Sulfadimetossina	25	mg
Sulfachinossalina	25	mg
Diaveridina	25	mg
<i>Eccipienti:</i> q.b. a	1,0	g

FORMA FARMACEUTICA:

Soluzione, limpida di colore giallo, per uso orale da diluire in acqua da bere.

SPECIE DI DESTINAZIONE ED INDICAZIONI:

Uccelli da gabbia e da voliera: Malattie batteriche. Coccidiosi.

Lo spettro di attività del medicinale comprende quindi: *Escherichia coli*, *Shigella spp.*, *Haemophilus Spp.*, *Salmonella Spp.*, *Pasteurella Spp.*, infezioni da stafilococco, streptococco ed actinobacillus, Rickettsiae ed alcuni protozoi, tra cui i Coccidi.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO.

Sciogliere da 1,3 a 3,0 ml / 1,0 litri, corrispondenti a 30/50 gocce per litro, diluendo accuratamente nell'acqua alle dosi indicate, per 3 – 5 giorni.

Rimuovere l'acqua dalle ciotole e somministrare acqua medicata. Suddividere la dose giornaliera di medicinale in due parti uguali e praticare il trattamento ogni 12 ore. L'acqua medicata va consumata entro 12 ore dalla preparazione.

Non miscelare in mangimi solidi.

TEMPO DI ATTESA:

Non pertinente. Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

CONTROINDICAZIONI:

Non somministrare per un periodo di tempo prolungato.

Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti.

AVVERTENZE SPECIALI:

Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Evitare la somministrazione in acque eccessivamente acide.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali:

Si deve evitare il contatto diretto e l'inalazione del prodotto durante le operazioni di solubilizzazione nelle bevande e nei mangimi liquidi. Buona norma è l'uso di guanti e di mascherina di carta.

Le persone con nota ipersensibilità ai sulfamidici devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

REAZIONI AVVERSE:

Si possono verificare casi di anafilassi in soggetti sensibilizzati.

Impiego durante l'ovodeposizione

Non utilizzare in ovodeposizione.

Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione

Dati non disponibili.

Sovradosaggio

Dosi più alte di quelle indicate non inducono particolari patologie. In ogni caso non superare le dosi consigliate.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata dei bambini

Conservare il medicinale ad una temperatura non superiore a 25 °C, nella confezione originale, in luogo fresco ed oscurato.

Dopo la prima apertura del contenitore usare entro 3 mesi.
L'acqua medicata deve essere utilizzata entro 12 ore dalla preparazione.

Non usare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

PRECAUZIONI SPECIALI DA PRENDERE PER ELIMINARE IL PRODOTTO INUTILIZZATO O MATERIALI DI RIFIUTO:

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

**MEDICINALE VETERINARIO SOGGETTO A PRESCRIZIONE.
DA VENDERSI SOLTANTO DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO VETERINARIA
NON RIPETIBILE.**

SOLO PER USO VETERINARIO

Lotto n°
del.....

DATA DI SCADENZA:

Confezione: 25 ml / 45 ml / 100 ml.

AIC n°: Bottiglia da 25 ml: 101986026.
Bottiglia da 45 ml: 101986038
Bottiglia da 100 ml: 101986014.

