

Tilosina 20% liquido Chemifarma

200 mg/ml, soluzione uso orale per suini, broilers e vitelli da latte.

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE:

1 kg contiene:

Principi attivi:

Tilosina	g 200
<i>Eccipienti:</i> q. b. a	g 1.000.

FORMA FARMACEUTICA:

Soluzione uso orale.

SPECIE DI DESTINAZIONE:

Suini, broilers e vitelli da latte.

INDICAZIONI:

Suini: enterite necrotica e polmonite enzootica, sostenute da agenti patogeni sensibili alla tilosina. Per informazioni riguardo alla dissenteria dei suini vedere paragrafo "Avvertenze Speciali".

Broilers: malattia cronica respiratoria, sostenuta da agenti patogeni sensibili alla tilosina.

Vitelli da latte: polmoniti da micoplasma e/o *pasteurella multocida*, sostenute da agenti patogeni sensibili alla tilosina

CONTROINDICAZIONI:

Non usare in animali con ipersensibilità nota alla tilosina o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

REAZIONI AVVERSE:

sono stati segnalati, in rari casi, edemi della mucosa rettale con prurito ed eritemi, soprattutto nel suino.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in etichetta si prega di informarne il veterinario.

MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE:

Suini: 5,0 – 6,0 g/100 kg p.v. (pari a 10 – 12 mg di tilosina/kg p.v.), per 3 – 7 giorni.

Broiler: 12,5 g/100 kg p.v. (pari a 25 mg di tilosina/kg p.v.), per 3 – 5 giorni.

Vitelli da latte: 20,0 – 25,0 g/100 kg p.v. (pari a 40 – 50 mg di tilosina/kg p.v.), per 3 – 7 giorni.

Miscelare in acqua o nel latte in polvere da ricostituire secondo le indicazioni del veterinario, avendo cura di non superare la posologia di p.a. in mg /kg p.v. giornaliera autorizzata.

Per evitare un sottodosaggio il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile.

Il consumo dell'acqua medicata dipende dalle condizioni cliniche degli animali. Al fine di ottenere il corretto dosaggio, la concentrazione della Tilosina deve essere calcolata conformemente.

Non miscelare in mangimi solidi.

TEMPI DI ATTESA:

Carne e visceri

Broilers: 1 giorno.

Suini: 1 giorno.

Vitelli da latte: 24 giorni.

Uso non consentito in uccelli che producono uova per consumo umano.

AVVERTENZE SPECIALI.

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

L'utilizzo ripetuto o protratto va evitato, migliorando le prassi di gestione e mediante pulizia e disinfezione.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: non somministrare a galline ovaiole in ovodeposizione, le cui uova sono destinate al consumo umano.

L'utilizzo del prodotto dovrebbe essere basato su test di sensibilità nei confronti dei batteri isolati dagli animali. Se ciò non fosse possibile la terapia dovrebbe essere basata su informazioni epidemiologiche locali (regionali, aziendali) circa la sensibilità dei batteri target.

L'uso improprio del prodotto potrebbe incrementare la prevalenza di batteri resistenti alla tilosina e ridurre l'efficacia dei trattamenti con altri antimicrobici a causa della possibile comparsa di cross-resistenza.

Un elevato tasso di resistenza in vitro è stato dimostrato in ceppi europei di *Brachyspira hyodysenteriae*, indicando che il medicinale non è sufficientemente efficace nei confronti della dissenteria dei suini.

Precauzioni speciali per la persona che somministra il medicinale agli animali:

è buona norma evitare il contatto diretto con il prodotto durante la sua manipolazione. Pertanto si consiglia l'uso di guanti e di maschera protettiva. In caso di contaminazione lavare abbondantemente con acqua. Le persone con nota ipersensibilità alla tilosina devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione:

sono stati evidenziati effetti indesiderati sulla fertilità e fenomeni teratogeni per cui il prodotto non deve essere utilizzato durante la gravidanza e la lattazione.

Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione:

è stata rilevata cross-resistenza reciproca tra tilosina e desmicosina.

Sovradosaggio:

sintomi non noti. Non superare le dosi consigliate.

Incompatibilità: nessuna nota.

DATA DI SCADENZA: MM/AAAA

Dopo prima apertura usare entro: 1 mese.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione: 36 ore.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE:

conservare in luogo asciutto a temperatura non superiore a 25°, proteggere dalla luce.

DA VENDERSI SOLTANTO DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO-VETERINARIA IN TRIPLICE COPIA NON RIPETIBILE.

SOLO PER USO VETERINARIO.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Confezione da 1kg: 103385011;

Confezione da 5 kg: 103385023.

NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto N°:



chemifarma® s.p.a.
INDUSTRIA FARMACEUTICA VETERINARIA