

**Colistina solfato 12% Chemifarma,
120 mg/g
polvere solubile per uso in acqua da bere per vitelli da latte, suini, broiler, tacchini, galline ovaiole
Colistina solfato**

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 g di prodotto contiene:

Principio attivo:

Colistina solfato mg 120

Eccipienti: q. b. a g 1

FORMA FARMACEUTICA

Polvere solubile da somministrare disciolta in acqua da bere.

CONFEZIONI

sacco da 5 Kg.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Vitelli da latte, suini, broiler, tacchini, galline ovaiole.

INDICAZIONI

Trattamento e metafilassi di infezioni enteriche causate da *E. coli* non invasivo sensibile alla colistina. Prima del trattamento metafilattico deve essere stabilita la presenza della malattia nel gruppo/mandria.

MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE.

Diluire accuratamente nell'acqua, secondo le indicazioni del Medico Veterinario prescrittore, avendo cura di non superare la posologia in mg/kg p.v. giornaliero autorizzata.

Vitelli da latte, suini, broiler, tacchini, galline ovaiole:

da 4,15 a 5,0 g/100 kg di peso vivo (pari a 5,0 - 6,0 mg di principio attivo/kg p.v.)

La durata della terapia deve essere limitata al tempo minimo necessario per il trattamento della malattia.

La durata del trattamento non deve superare i 7 giorni.

Non miscelare in mangimi solidi. Al fine di assicurare un dosaggio corretto, determinare il più accuratamente possibile il peso corporeo dell'animale per evitare sottodosaggio, utilizzare apparecchiature per il dosaggio idoneamente e adeguatamente calibrate.

TEMPI DI ATTESA

Carne

Vitelli da latte e suini: 7 giorni.

Polli da carne e tacchini: 0 giorni

Uova

Galline ovaiole: 5 giorni (uova)

AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

L'assunzione dell'acqua medicata da parte degli animali può essere alterata a seguito della malattia.

L'utilizzo ripetuto e protratto va evitato, migliorando le prassi di gestione mediante pulizia e disinfezione.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Non usare colistina in sostituzione delle buone pratiche di gestione.

La colistina è un farmaco di ultima istanza nella medicina umana per il trattamento di infezioni causate da alcuni batteri multiresistenti. Al fine di ridurre al minimo qualsiasi potenziale rischio associato a un impiego diffuso della colistina, l'utilizzo deve essere limitato al trattamento o al trattamento e alla metafilassi delle malattie e non essere previsto per la profilassi.

Ove possibile, la colistina deve essere usata unicamente sulla base di test di sensibilità.

L'uso del medicinale non conforme alle istruzioni riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto può portare all'insuccesso del trattamento e aumentare la prevalenza di batteri resistenti alla colistina.

Non lasciare a disposizione di altri animali l'acqua medicata.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Le persone con nota ipersensibilità al principio attivo o all'eccipiente, devono evitare il contatto con il medicinale veterinario.

Nella manipolazione del prodotto si dovrà utilizzare una speciale attrezzatura protettiva composta da indumenti protettivi, guanti e mascherina. Non inalare, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.

In caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua e sapone. Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione; lavare le mani dopo l'uso.

Controindicazioni

L'assorbimento gastroenterico della colistina solfato è scarso, tuttavia si deve evitare l'uso del prodotto in soggetti con segni di insufficienza renale. Non somministrare a poligastri con ruminante funzionante.

Non somministrare ad animali con ipersensibilità accertata alla colistina o all'eccipiente.

Non usare nei cavalli, in particolare nei puledri, poiché la colistina, a causa di un'alterazione dell'equilibrio della microflora gastrointestinale potrebbe portare allo sviluppo di colite da antimicrobici (colite X), tipicamente associata a *Clostridium difficile*, che può essere fatale.

Reazioni avverse

La somministrazione orale, a dosi prolungate e/o eccessive, può, in rari casi, provocare disturbi gastrointestinali (vomito, nausea, diarrea). Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questa etichetta si prega di informarne il medico veterinario.

Impiego nel corso della gravidanza, dell'allattamento o l'ovodeposizione.

Non sono segnalati effetti di particolare gravità nelle specie di destinazione. Usare conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione.

La colistina presenta resistenza crociata con Polimixina B.

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)

Dati non disponibili. Non superare le dosi consigliate.

DATA DI SCADENZA

SCAD: MM/AAAA.

Dopo la prima apertura del confezionamento primario il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

Dopo la solubilizzazione in acqua da bere entro 24 ore.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

SOLO PER USO VETERINARIO.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA IMMISSIONE IN COMMERCIO E DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEL LOTTO: Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì.

NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

AIC n° 102560012.

NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto N°: del

Peso netto: 5 Kg.

DA VENDERSI SOLTANTO DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO VETERINARIA IN TRIPLICE COPIA NON RIPETIBILE.

