

**SPIRAMICINA 20% - CHEMIFARMA**  
820.000 U.I./g

**Polvere per uso in acqua da bere o alimento liquido per polli da carne ,suini e vitelli da latte**

**INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE**

1 g di polvere contiene:

*Principio attivo:*

Spiramicina 820.000 U.I. (pari a circa 200 mg)

*Eccipienti:*

q.b. a g 1,00

**FORMA FARMACEUTICA**

Polvere solubile per uso in acqua da bere o in alimento liquido.

Polvere scorrevole di colore bianco.

**CONFEZIONI**

Busta da 100 g

Barattolo da 1 kg

Sacchetto da 5 kg

**SPECIE DI DESTINAZIONE**

Suini, polli da carne (escluso galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano) e vitelli da latte.

**INDICAZIONI**

**Suini:** trattamento della enterite batterica da microorganismi Gram + sensibili alla spiramicina e della polmonite enzootica sostenuta da germi sensibili alla spiramicina.

**Polli da carne:** trattamento delle malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato locomotore. Setticemie sostenute da microorganismi Gram + sensibili alla spiramicina.

**Vitelli da latte:** malattie respiratorie e malattie neonatali sostenute da microorganismi Gram + sensibili alla spiramicina.

**MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE.**

Per evitare un sottodosaggio, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile. Disciogliere nell'acqua, nel mangime liquido o nel latte da ricostituire alle dosi indicate, avendo cura di non superare la dose in p.a./kg di p.v. autorizzata.

Suini: nell'acqua di bevanda o nel mangime liquido 125 mg/kg di peso vivo (pari a 25 mg di principio attivo/kg p.v.), da ripetersi per 3-5 giorni.

Broilers (escluso galline che producono uova destinate al consumo umano): 2,5 – 5,0 g/litro di acqua da bere (pari a 0,5 – 1,0 g di principio attivo/litro), per 3-5 giorni.

Vitelli da latte: 125 mg/kg di peso vivo (pari a 25 mg di principio attivo/kg p.v.), da ripetersi per 3-5 giorni.

**TEMPI DI ATTESA**

Carne e visceri:

Suini: 7 giorni.

Polli da carne 15 giorni.

Vitelli da latte: 31 giorni.

Uso non consentito in galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano.

**AVVERTENZE SPECIALI**

**Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione**

Non somministrare per via orale a vitelli con ruminazione funzionante. L'assunzione dell'acqua medicata o dell'alimento liquido da parte degli animali può essere alterata a seguito della malattia.

L'utilizzo ripetuto e protratto va evitato, migliorando le prassi di gestione mediante pulizia e disinfezione.

**Precauzioni speciali per l'impiego negli animali**

Non somministrare in mangimi solidi.

L'uso del prodotto deve essere basato su test di sensibilità, nell'osservanza delle disposizioni di legge, locali e ufficiali, relative alle sostanze antimicrobiche.

L'uso del prodotto non conforme a quanto indicato nelle istruzioni dell'etichetta può aumentare la prevalenza dei batteri resistenti alla spiramicina e può diminuire l'efficacia del trattamento con altre classi di antimicrobici, per potenziale resistenza crociata. Non lasciare a disposizione di altri animali l'acqua medicata.

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali**

Le persone con nota ipersensibilità alla spiramicina o ai macrolidi devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

Manipolare il prodotto con l'uso di guanti e mascherina protettivi; evitare l'inalazione, l'ingestione e il contatto con la

pelle e con gli occhi. In caso di contaminazione lavare abbondantemente con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste consultare il medico.

In caso di inalazione o ingestione accidentali, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli l'etichetta.

#### **Controindicazioni**

Non somministrare ad animali con ipersensibilità accertata o presunta alla spiramicina o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Non somministrare a galline che producono uova destinate al consumo umano.

#### **Reazioni avverse**

Si può verificare qualche caso di disturbo gastrointestinale.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questa etichetta si prega di informarne il veterinario.

#### **Impiego nel corso della gravidanza, l'allattamento e l'ovodeposizione**

In gravidanza il prodotto va somministrato solamente dopo valutazione del rapporto rischio /beneficio da parte del medico veterinario.

Uso non consentito in galline ovaiole in ovodeposizione che producono uova destinate al consumo umano.

#### **Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione.**

La spiramicina non deve essere somministrata insieme ad antibiotici battericidi quali le penicilline.

Resistenza crociata con eritromicina e carbomicina.

#### **Incompatibilità**

In assenza di studi di compatibilità, non miscelare con altri medicinali veterinari

#### **Sovradosaggio**

Non sono noti i sintomi da sovradosaggio correlati all'uso del prodotto.

#### **DATA DI SCADENZA**

**SCAD:** MM/AAAA.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

Dopo prima apertura e dopo ogni prelievo del prodotto richiudere accuratamente la confezione e tenerla ben chiusa.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 1 mese

Periodo di validità dopo ricostituzione o diluizione conformemente alle istruzioni:12 ore.

#### **PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Conservare in un luogo asciutto.

#### **PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici ma devono essere conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

#### **SOLO PER USO VETERINARIO.**

**Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

#### **NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO e dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti:**

Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì.

#### **NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Busta da 100 g: AIC n° 103409013

Barattolo da 1 kg: AIC n° 103409025

Sacchetto da 5 kg: AIC n° 103409037

#### **NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto N°:

#### **ALTRE INFORMAZIONI**

##### **Proprietà farmacologiche**

Gruppo farmacoterapeutico: Antibiotici per uso sistemico - Macrolidi.

Codice ATC Vet: QJ01FA02

**DA VENDERSI SOLTANTO DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO VETERINARIA IN TRIPLICE COPIA NON RIPETIBILE.**