

prevalenza dei batteri resistenti alla tiamulina. Non lasciare a disposizione di altri animali l'acqua medicata. In assenza di risposta al trattamento entro 3 giorni, rivedere la diagnosi. Evitare la somministrazione della tiamulina in concomitanza con i prodotti ionofori monensina, narasina e salinomicina. Informare il fornitore dell'alimento dell'utilizzo della tiamulina, al fine di evitare l'incorporamento dei suddetti prodotti nel mangime e la contaminazione di quest'ultimo. Nel caso in cui si sospetti una contaminazione, il mangime deve essere testato per verificare la presenza di tali ionofori prima di essere somministrato. Se si manifestano reazioni avverse dovute all'interazione, sospendere immediatamente la somministrazione dell'alimento. Rimuovere il mangime contaminato quanto prima e sostituirlo con uno non contaminato.

Precauzioni speciali per le persone che somministrano il medicinale veterinario agli animali:

È buona norma evitare il contatto con la pelle, gli occhi, le mucose e l'inalazione del medicinale. Gli operatori, pertanto, devono utilizzare indumenti protettivi per manipolare il prodotto: tute, guanti impermeabili e un respiratore di protezione per il viso monouso conforme allo standard Europeo EN 149 o un respiratore multiuso conforme allo standard Europeo EN 140, con un filtro conforme allo standard Europeo EN 143. Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto. In caso di contaminazione accidentale lavare abbondantemente con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste, consultare il medico.

Le persone con nota ipersensibilità alla tiamulina o ad uno qualsiasi degli eccipienti devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

Impiego nel corso della gravidanza o allattamento:

La somministrazione nelle femmine gravide va effettuata solamente dopo valutazione del rapporto rischio/beneficio da parte del medico veterinario.

Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

Non somministrare contemporaneamente ad additivi del gruppo degli ionofori (monensin, narasin, salinomicina) perché possono determinare negli animali trattati paralisi irreversibili con esiti letali. È noto che la tiamulina provoca interazioni clinicamente importanti (spesso letali) con gli antibiotici ionofori, tra cui la monensina, la narasina e la salinomicina. Pertanto, ai suini non devono essere somministrati prodotti contenenti tali composti durante il trattamento con questo medicinale, né nei sette giorni antecedenti o successivi al trattamento come minimo: ne possono conseguire un grave nanismo o il decesso. La tiamulina può ridurre l'azione antibatterica degli antibiotici betalattamici, la cui azione dipende dalla crescita batterica.

Incompatibilità:

La tiamulina non deve essere somministrato in combinazione con monensin od altri ionofori. In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari.

CONTROINDICAZIONI:

Non somministrare in caso di ipersensibilità nota alla tiamulina o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

REAZIONI AVVERSE:

Si è osservato qualche caso di superinfezione da microrganismi non sensibili alla tiamulina.

Possibile alterazione della flora batterica intestinale, diarrea e feci molli.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non indicate in questa etichetta si prega di informarne il veterinario.

SOVRADOSAGGIO

Dati non disponibili. Non superare le dosi consigliate.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa tra 2 °C e 28 °C.

PERIODO DI VALIDITA' DEL PRODOTTO CORRETTAMENTE CONSERVATO

12 mesi. Dopo prima apertura: 3 mesi. Validità dopo dissoluzione in acqua da bere: 12 ore.

Dopo la dissoluzione in alimento liquido consumare l'alimento medicato immediatamente e non conservare.

ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO INUTILIZZATO E DEI MATERIALI DI SCARTO:

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivanti da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

DA VENDERSI SOLTANTO DIETRO PRESENTAZIONE DI PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA IN TRIPLICE COPIA NON RIPETIBILE.

SOLO PER USO VETERINARIO

Lotto n°:

Scadenza:

Confezione da 100 g: 103438038;

Confezione da 1 kg: 103438014;

Confezione da 5 kg: 103438026.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA IMMISSIONE IN COMMERCIO E RESPONSABILE DEL RILASCIO DEL LOTTO:

Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì.

